



OP. DR. AHMET CAYMAZ

KBB HASTALIKLARI, BAŞ & BOYUN CERRAHİSİ

## ÇENE ESTETİĞİ AMELİYATI (MENTOPLASTİ/GENİOPLASTİ) BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Bu formun amacı, sağlığınız ile ilgili konularda sizi bilinçlendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır.

Bu form, çoğu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tanımlanmış olmakla birlikte bütün tedavi şekillerinin risklerini içeren bir belge olarak düşünülmemelidir. Kişisel sağlık durumunuza bağlı olarak, hekiminiz size farklı ya da ek bilgi verebilir.

Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bağlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediğiniz zaman onamı geri alabilirsiniz.

### Çene Estetiği Ameliyatı Hakkında

Çene estetiği ameliyatı dişlerin, çene kemiklerinin, diğer yumuşak ve sert dokuların anatomik en iyi yerine çekilmesi için yapılan müdahaleleri içerir. Genellikle estetik amaçlı değildir. Ancak normale getirilen çeneler daha estetik bir görünüm kazandırabildiği gibi bazen diş ilişkisini değiştirmeden yapılan estetik amaçlı girişimler de mevcuttur. Çene ucu girişimleri genellikle asimetriyi düzeltmek, çene ucunu büyütme veya küçültme, çene ucunu öne almak veya geriye itme ve bu işlemlerin herhangi bir kombinasyonundan oluşur. Bu işlemler çene ucu kemiğinden kesi yapılarak ya da yapılmadan gerçekleştirilebilir. Çene ucundan kemik çıkarılabildiği gibi başka yerden yapılan kesi ile kemik, kırık veya başka bir doku olarak çene ucuna eklenebilir. Ayrıca çene ucu için özel implantlar uygulanabilir, işlemler yüzdeki başka iskelet bozukluklarının düzeltilmesi ve yüz gençleştirme ameliyatına eşlik edebilir.

### Ortaya Çıkabilecek Yan Etkiler

- Dikişler alındıktan sonra kesi çizgisinde karşılıklı gelen yara dudakları birbirinden ayrılabilir, yara kenarlarının tekrar birleştirilmesi gerekebilir.
- Cerrahiden kaynaklı ağrı oluşabilir.
- Ödem (şişlik) genellikle 7-10 gün içerisinde azalır.
- Kesi yerinden nadir de olsa kan gelmesi görülebilir.
- Çene ucunda kan birikmesine bağlı olarak aşırı bir şişme olabilir ve zamanla boyna doğru inerek morarma yapabilir. Şişlik yaklaşık 3 ay içinde büyük ölçüde geçer ve çene ucunun yeni şekli ortaya çıkar. Ani gelişen tüm şişliklerde lütfen hekimimiz ile iletişime geçiniz.
- Ameliyat sonrası ilaç kullanımına uyulmaması ve ağız hijyeninin tam sağlanmaması gibi durumlar enfeksiyona; kesilen kemiği sabitlemek için kullanılan titanyum plak veya vidalar ağrıya neden olabilir. İmplantların bu tip durumlarda çıkarılması gerekebilir.
- Yüz siniri kulağın altından yanağa doğru gelir ve yüzün bir yarısındaki bütün mimik kaslarını çalıştırır. Çene ucu kemiği kesilirken bu sinirin dudak birleşimi ve alt dudağı çeken dalı yaralanabilir. Bunun sonucunda dudak aşağı ve dışa çekilemez. Bu durum 6-12 ay sürebilir, nadiren de olsa kalıcı olabilir.
- Tespitin yetersiz olması, enfeksiyon, ameliyat sonrası bölgeye alınan darbeler ya da tavsiyelere tam uyulmaması durumunda kemik kesisi hattında olmaması gereken hareket tespit edilebilir.

- Şeker hastaları, sigara içen kişiler, beslenme bozukluğu olanlar, kilolu hastalar ve bazı kişilere özel durumlarda yara iyileşmesi normal sağlıklı kişilere oranla daha zordur. Çene altından yapılan kesilerde iz kalma ihtimali daha fazladır.
- Kesilen her yerde iyileşmeden sonra az veya çok yara izi kalır. Bu genellikle kabul edilebilir düzeyde olurken bazen anormal yara izleri, rengi etraf ciltten farklı tonlarda olabilir. Bu yara izlerinin tedavisinde ek küçük işlemler uygulanabilir.
- Yüzünüzde asimetri sorunu varsa sadece çene estetiği ameliyatı ile bu sorun düzelmez, genel yüz görünümünüz daha iyi bir hale gelebilir. Ancak çeneniz daha düz ve orta hatta olmasına rağmen yüz-çene ilişkisindeki asimetri daha belirgin hale gelebilir. Asimetrisi düzeltilen çene, yüzün diğer asimmetrik bölümlerini daha dikkat çekici kılabilir.

### Hastanın Sağlığı İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri

- Taburculuk aynı gün planlanabilir. Bu kendinizi nasıl hissettiğiniz, ödeminizin ne kadar olduğuna ve damar içi sıvı ihtiyacınıza göre değişir.
- Ağız hijyeni iyileşmeyi hızlandırır ve son derece önemlidir. Her yemek sonrası ağızınızı bol su ile çalkayıp ardından verilen ilaç veya dezenfektan solüsyonu ile 7-10 gün boyunca tarife uygun olarak ağız temizliğinizi yapınız.
- 3-4 gün sonra dişlerinizi diş etlerinizdeki kesi yerlerine temas etmeden çocuk fırçası (küçük ve yumuşak fırça) ile nazikçe fırçalayarak temizleyiniz.
- Ameliyat sonrası 3 gün sadece sıvı gıdalar, takip eden 3 gün yumuşak gıdalar, ardından normal beslenmeye geçebilirsiniz.
- Ameliyat sonrası 7 gün boyunca düzenli olarak antibiyotik kullanmanız gerekir.
- Ağızınızdaki dikişleriniz 1-2 ay içinde kendiliğinden eriyecektir, temiz tutmanız iyileşme hızını olumlu yönde etkileyecektir. Erime esnasında ağızınıza gelen parçaları yutmanızda bir sakınca yoktur. Varsa cildinizdeki dikişler 5-7 gün içinde alınacaktır.
- 3 ay ağır spor yapmanız ve ağır eşya taşımanız yasaktır.

Tanı \_\_\_\_\_  
Yapılacak tedavi/işlem \_\_\_\_\_

Yapılacak olan tedavinin amacı, süresi, yararları, başarı şansı, iyileşme süreci, olası risk ve komplikasyonları, alternatif yöntemleri ve tedaviyi kabul etmeme durumunda karşı karşıya kalabileceğiniz durumlar hakkında bilgi sahibi olmak istemiyorsanız el yazınız ile belirtiniz.

Hekimim hastalığım hakkında bilgi verdi; nasıl bir tedavi yapılacağını, amacını, süresini, yararlarını, başarı şansını, mevcut durumu iyileştirme garantisi olmayabileceğini, iyileşme sürecini, olası risk ve komplikasyonları, alternatif yöntemleri, tedaviyi kabul etmemem durumunda karşı karşıya kalabileceğim durumları, gerekli görülmesi halinde ek bir ameliyat/girişim/uygulama yapılabileceğini açıkladı. Bu konulara ilişkin tüm sorularımı yanıtladı.

Hekimimin yetkisi, gözlemi ve yönetimi altında, yukarıda açıklanan uygulamanın üzerimde/yasal temsilcisi olduğum hasta üzerinde hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirileceği anlatıldı.

Yapılacak uygulama sırasında, gerektiği takdirde, anestezi uygulamasının anesteziyoloji uzmanı, sedasyon uygulamasının anesteziyoloji uzmanı veya sedasyon uygulamada yetkin bir hekim, lokal anestezinin hekimim tarafından yapılacağı açıklandı.

Aklım başımda ve karar verme yetimin yeterli olduğunu kabul ederek yapılacak olan tıbbi uygulamayı kabul ediyorum, hekimim ve ekibinin gerekli gördüğü tıbbi tedavi/cerrahi/işlemi gerçekleştirmesine onam veriyorum.

Hastaneye, söz konusu olduğunda, yukarıda onam verdiğim uygulama sırasında çıkarılmış olan doku ya da organların muayene, tetkik, imha edilmesi ya da saklanması için izin veriyorum.

Kimlik bilgilerim saklı tutulmak kaydıyla, tıbbi kayıtlarımın bilimsel araştırmalarda kullanılmasına izin veriyorum.

<b>Hasta</b> Adı soyadı: _____ Doğum tarihi: _____ Hastanın yasal temsilcisi Adı soyadı: _____ Yakınlık derecesi: _____ Hastanın yasal temsilcisinden onam alınma nedeni: <input type="checkbox"/> Hastanın bilinci kapalı <input type="checkbox"/> Hastanın karar verme yetisi yok	<b>İmza:</b> _____ <b>Tarih:</b> _____ <b>Saat:</b> _____	<b>İmza:</b> _____ <b>Tarih:</b> _____ <b>Saat:</b> _____	<b>İmza:</b> _____ <b>Tarih:</b> _____ <b>Saat:</b> _____
<b>Şahit</b> Adı soyadı: _____	<b>İmza:</b> _____	<b>Tarih:</b> _____	<b>Saat:</b> _____
<b>Bilgilendirmeyi yapan hekim</b> Adı soyadı: _____	<b>İmza:</b> _____	<b>Tarih:</b> _____	<b>Saat:</b> _____
<b>Tercüman (ihtiyaç halinde)</b> Adı soyadı: _____	<b>İmza:</b> _____	<b>Tarih:</b> _____	<b>Saat:</b> _____

18 yaşın üzerindeki hastanın kendisinden; 15-18 yaş arasındaki hastanın kendisinden ve ayrıca yasal temsilcisinden; bilinci kapalı, 15 yaşın altında, karar verme yetisi bulunmayan hastada ve tıbbi acil durumlarda yasal temsilciden onam alınır.