



OP. DR. AHMET CAYMAZ

KBB HASTALIKLARI, BAŐ & BOYUN CERRAHİSİ

## DERMOFAT GRAFT VE/VEYA YAĐ ENJEKSİYONU BİLGİLENDİRİLMİŐ ONAM FORMU

Bu formun amacı, sađlıđınız ile ilgili konularda sizi bilinçlendirerek alınacak karara katılımınızı sađlamaktır.

Bu form, çođu hastanın pek çok koşulda ihtiyaçlarını karŐılayacak Őekilde tanımlanmıŐ olmakla birlikte bütn tedavi Őekillerinin risklerini içeren bir belge olarak dŐnlmemelidir. KiŐisel sađlık durumunuza bađlı olarak, hekiminiz size farklı ya da ek bilgi verebilir.

Tanı, tıbbi tedavi ve cerrahi giriŐimlerin yararlarını ve olası risklerini đrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek kendi kararınıza bađlıdır. Yasal ve tıbbi zorunluluk taŐıyan durumlar dıŐında bilgilendirmeyi reddedebilir veya dilediđiniz zaman onamı geri alabilirsiniz.

### İŐlem Hakkında Bilgilendirme

Yz ve vcudun çeŐitli yerlerinde, hacim arttırmak ve dolgunluk sađlamak için kullanılabilen yöntemlerden birisi de yađ ve doku enjeksiyonlarıdır. Yanaklar, alın, yanak-dudak çizgisi, dudaklar, çene ucu, kalça ve bacaklarda çkk alanlar bu uygulamanın yapıldıđı yerlere rnek olarak sayılabilir.

Dermofat graft; derinin yzeyel sert tabakası ve bir kısım yađ dokusunu içerir ve derinin st kısmı soyularak elde edilir. Aynı anda yapılan baŐka bir ameliyat alanından veya daha nce geçirmiŐ olduđunuz bir ameliyat alanı var ise oradaki izden girilerek veya vcudun gizlenebilen alanlarından alınır. Alınan alanda mutlaka az veya çok iz kalır. Dermofat dreft yerleŐtirdiđi alanda genellikle 1-2 adet 3-4 mm'lik kesi yapmayı gerektirir. Yađ enjeksiyonuna gre kalacak miktar nceden daha iyi tahmin edilebilir; ancak alınacak miktar sınırlı olduđu için geniŐ alanlara dolgu maddesi olarak yetersiz kalır.

Yađ enjeksiyonu, genellikle kiŐinin kendisinden alınan yađ, yıkanma ve szlme gibi bazı zel iŐlemlerden geçirilerek belli bir konsantrasyona ulaŐtırılır, daha sonra ince tpler yardımıyla enjekte edileceđi alana verilir. Eđer kiŐiye aynı anda bazı baŐka cerrahi iŐlemler yapılacaksa bu ameliyatlara elde edilecek dokular yađ dokusuna eklenerek enjekte edilebilir. KiŐinin kendisinden alınan dokular olduđu için istenmeyen bir etki ve sonuç beklenmez. Ayrıca enjeksiyon çk kçk noktalardan yapıldıđından, enjeksiyon yerinde herhangi bir iz olması beklenmez.

Yađ enjeksiyonlarında yađın alınacađı blge seçilirken genellikle vcutta yađlanmanın fazla olduđu blgeler tercih edilmektedir. Bu blgeler çođunlukla karın, bel ve (bayanlarda daha çok olmak zere) kalçadır.

Yađ enjeksiyonu ile elde edilecek doku bytme oldukça sınırlıdır. Beklentiler bu nedenle gerçeki olmalıdır. AŐırı oranlarda byme isteniyorsa, kalıcı implantların kullanılması tercih edilmelidir. Bunu test etmek amacıyla nce yađ enjeksiyonları yapılır, daha sonrada eđer arzu edilirse implant uygulamalarına geçilir.

Enjekte edilen dokuların bir bölümü vücut tarafından emilerek yok edildiği için bir süre sonra yeni enjeksiyonlar gerekebilir. Uygulama alanı, verilen miktar, dokuların durumu değerlendirilerek bu işlemin etkinliği ve elde edilebilecek sonuçlar tartışılır. Erime oranı %30-70 arasında değişebilir. Bu miktar enjeksiyonun yapıldığı bölgenin hareketli veya hareketsiz olması özelliğine bağlı olarak farklılıklar gösterir. Alın ve çene ucu gibi hareketsiz alanlarda yağın tutma ve emilme oranına kıyasla, ağız çevresi gibi hareketli alanlarda tutma ve emilme oranı daha farklıdır.

Bu konudaki bir diğer uygulama, ilk işlem sırasında gereğinden fazla yağ ve doku ayırıp doku bankasında saklayarak ileride yapılacak enjeksiyonlar için hazırlık yapmaktır.

İşlem öncesinde 10 gün süreyle aspirin gibi kan sulandırıcı ajanlardan kaçınılmalıdır. Ayrıca hastanın geçmişindeki önemli rahatsızlıklar ve sürekli kullandığı ilaçlar varsa mutlaka doktora bildirilmelidir.

Tek başına yağ enjeksiyonları sedasyon, lokal anestezi veya sadece lokal anestezi ile yapılabilir. Bu müdahaleler hastane yatış işlemi gerektirmeyen müdahaleler olup hasta aynı gün, işlem-den birkaç saat sonra evine gidebilir.

Yağ enjeksiyonu işlemi biter bitmez uygulama bölgesinde şişliği azaltmak amacıyla soğuk uygulamasına geçilir. Soğuk uygulaması jeller veya içi buz dolu torbalar yardımıyla yapılır.

Genellikle saat başı 15 dakikada bir o bölgeye dolaştırılarak uygulanır. Doğrudan buzun deriye temas etmemesi gerekir. Buz ya da jelin olduğu torba bir tülbent veya havlu yardımıyla işlem bölgesine uygulanır.

İşlem sonrası, özellikle ilk iki gün, uygulama bölgesinde yağ enjeksiyonu miktarının ötesinde bir şişlik beklenir. Bu şişlik zamanla azalacaktır. Ancak dudak bölgesine yapılan enjeksiyonlarda süre uzayabilir ve şişlik bazen aşırı miktarlarda olabilir. Uygulama bölgesi işlemin hemen ertesi günü yıkanabilir ve nemlendirici krem sürülebilir. 4.-5. günden sonra uygulama bölgesine hafif bir masaj yapılması şişliklerin dağılmasına yardımcı olur. Şişliği artırması nedeniyle aşırı sıcaktan ve buhardan kaçınmak gereklidir.

Yağ enjeksiyonu, ilk birkaç gün dışında, genel olarak insanın günlük yaşantısını etkileyecek boyutlarda bir rahatsızlık vermez. İlk iki gün ödemin fazlalığı ve bazı alanlarda oluşabilecek morluklar nedeniyle daha çok dinlenerek geçirilmelidir.

Yağ enjeksiyonu için giriş noktalarına konulan küçük bantlar işlem-den birkaç saat sonra ya da ertesi günü alınabilir. Koruyucu amaçla antibiyotik kullanımı önerilir. Bu süre yaklaşık 5 gündür. 5. günden sonra antibiyotik kullanımına gerek yoktur. Giderek azalan ödemler herhangi bir aşamada artacak olursa, bölgede hassasiyet ve ısı artışı meydana gelirse, bu bir enfeksiyonun habercisi olabilir. Bu durumda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

İşlem-den sonra erken dönemde yüzün ya da enjeksiyon alanının görüntüsünü sadece verilen yağ oluşturmaz. Ayrıca her ne kadar küçük olsa da cerrahi bir müdahale gerçekleştiği için o bölgede ödem gelişmesi normaldir. Bu ödemle yağ enjeksiyonunu birbirine karıştırmamak gerekir. Ödem ameliyattan sonraki günlerde hızlı bir şekilde dağılır, zamanla azalır ve kaybolur. Yağ enjeksiyonu ile yapılan doku büyütmesi işlemi ise kalıcı bir yöntemdir.

## Olası Komplikasyonlar

- Kanama: Ameliyat sırası ve sonrasında ameliyat alanlarında kanama görülebilir. Kan kaybı miktarına göre kan vermek gerekebilir.
- Enfeksiyon: Ameliyat alanlarında kızarıklık, şişlik, kötü kokulu akıntı ve apseleşme gösterebilen ve antibiyotik kullanımı gerektirebilen enfeksiyon görülebilir. Enfekte alanı boşaltmak için küçük kesi gerekebilir.
- Asimetri ve Kontur Farklılıkları: Yanak-dudak birleşimindeki oluklarda ve/veya dudaklarda asimetri, yüzey düzensizlikleri, gamzelenme ve çentiklenmeler, kontur farklılıkları oluşabilir. Bu durum zaman içinde kendiliğinden düzelebileceği gibi kalıcı da olabilir. Benzer bu problemler yağın alındığı alanlarda da olabilir.
- Görüntü: Enjekte edilen yağların bir kısmının eriyeceği göz önünde bulundurularak gereken miktarın %10-30'u kadar fazla enjeksiyon yapılabilir (overcorrection). Buna bağlı olarak ilk birkaç hafta ödemin de etkisiyle normalden daha fazla bir şişlik olabilir. Dermofat graft genellikle gerekenden fazla konmaz, çünkü erimesi daha sınırlıdır.
- Morarma: Ameliyat alanlarında morarmalar görülebilir. Bu durum genellikle ortalama 2-6 hafta içinde ortadan kalkar.
- Enjekte Edilen Yağların Erimesi: Bazı durumlarda enjekte edilen yağlar haftalar içinde vücut tarafından emilebilir. Benzer şekilde ameliyat sonrası 5-6 ay içinde yağların tamamı eriyebilir.
- Duyu: Yağ alınan alanlarda hissizlik, aşırı hassasiyet olabilir. Bu durum genellikle geçici olmakla birlikte nadiren kalıcı olabilir. Yağ enjekte edilen alanlarda gerginliğe bağlı benzer yakınmalar görülebilir.
- Yağ Embolisi: Yağ alınan alandan kopan yağ parçacıkları damarların içine geçip sistemik dolaşıma katılıp akciğerler, beyin ya da başka bir organ ya da dokunun dolaşımını bozabilir. Bu durum felç veya ölüme varan ciddi sonuçlara yol açabilir.
- İzler: Anormal yara iyileşmesi sonucunda dikiş hatlarında belirgin yara izi (hipertrofik skar/keloid) oluşabilir. Dermofat graft alınan alanda yara izi oluşabilir. Dermofat graft uygulanan alanda da uygulanan miktara göre değişmek ile birlikte genellikle 4-5 mm'lik çok belli olmayan iz gelişir. Nadiren bu belirgin kötü bir iz haline dönebilir.

## Gerekebilecek Ek Cerrahi İşlemler

Dermofat graft ve/veya yağ enjeksiyonunun kısa ve uzun dönem sonuçlarını etkileyebilecek risk ve komplikasyonlara ek olarak farklı durumlar da söz konusudur. Nadir görülseler de yukarıda bahsedilenlerden başka riskler de görülebilir. Komplikasyon gelişmesi halinde ek tedaviler veya cerrahi girişim gerekebilir. Tıp ve cerrahide kesinlik yoktur. İyi sonuçlar beklense de elde edilebilecek sonuçlar hakkında hiçbir garanti veya teminat verilemez.

## Diğer Tedavi Seçenekleri

Dermofat graft ve/veya yağ enjeksiyonu elektif bir cerrahi girişimdir. Alternatif tedaviler arasında bu cerrahi yapılmamak, medikal cilt bakımları yaptırmak, geçici veya kalıcı dolgu maddelerinin enjeksiyonu sayılabilir. Riskler ve potansiyel yan etkiler cerrahi içeren alternatif tedavi yöntemleri ile ilişkilidir.

Tanı \_\_\_\_\_  
Yapılacak tedavi/işlem \_\_\_\_\_

Yapılacak olan tedavinin amacı, süresi, yararları, başarı şansı, iyileşme süreci, olası risk ve komplikasyonları, alternatif yöntemleri ve tedaviyi kabul etmeme durumunda karşı karşıya kalabileceğiniz durumlar hakkında bilgi sahibi olmak istemiyorsanız el yazınız ile belirtiniz.

Hekimim hastalığım hakkında bilgi verdi; nasıl bir tedavi yapılacağını, amacını, süresini, yararlarını, başarı şansını, mevcut durumu iyileştirme garantisi olmayabileceğini, iyileşme sürecini, olası risk ve komplikasyonları, alternatif yöntemleri, tedaviyi kabul etmemem durumunda karşı karşıya kalabileceğim durumları, gerekli görülmesi halinde ek bir ameliyat/girişim/uygulama yapılabileceğini açıkladı. Bu konulara ilişkin tüm sorularımı yanıtladı.

Hekimimin yetkisi, gözlemi ve yönetimi altında, yukarıda açıklanan uygulamanın üzerimde/yasal temsilcisi olduğum hasta üzerinde hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirileceği anlatıldı.

Yapılacak uygulama sırasında, gerektiği takdirde, anestezi uygulamasının anesteziyoloji uzmanı, sedasyon uygulamasının anesteziyoloji uzmanı veya sedasyon uygulamada yetkin bir hekim, lokal anestezinin hekimim tarafından yapılacağı açıklandı.

Aklım başımda ve karar verme yetimin yeterli olduğunu kabul ederek yapılacak olan tıbbi uygulamayı kabul ediyorum, hekimim ve ekibinin gerekli gördüğü tıbbi tedavi/cerrahi/işlemi gerçekleştirmesine onam veriyorum.

Hastaneye, söz konusu olduğunda, yukarıda onam verdiğim uygulama sırasında çıkarılmış olan doku ya da organların muayene, tetkik, imha edilmesi ya da saklanması için izin veriyorum.

Kimlik bilgilerim saklı tutulmak kaydıyla, tıbbi kayıtlarımın bilimsel araştırmalarda kullanılmasına izin veriyorum.

<b>Hasta</b> Adı soyadı: _____ Doğum tarihi: _____ Hastanın yasal temsilcisi Adı soyadı: _____ Yakınlık derecesi: _____ Hastanın yasal temsilcisinden onam alınma nedeni: <input type="checkbox"/> Hastanın bilinci kapalı <input type="checkbox"/> Hastanın karar verme yetisi yok	<b>İmza:</b> _____ <b>Tarih:</b> _____ <b>Saat:</b> _____	<b>İmza:</b> _____ <b>Tarih:</b> _____ <b>Saat:</b> _____	<b>İmza:</b> _____ <b>Tarih:</b> _____ <b>Saat:</b> _____
<b>Şahit</b> Adı soyadı: _____	<b>İmza:</b> _____	<b>Tarih:</b> _____	<b>Saat:</b> _____
<b>Bilgilendirmeyi yapan hekim</b> Adı soyadı: _____	<b>İmza:</b> _____	<b>Tarih:</b> _____	<b>Saat:</b> _____
<b>Tercüman (ihtiyaç halinde)</b> Adı soyadı: _____	<b>İmza:</b> _____	<b>Tarih:</b> _____	<b>Saat:</b> _____

18 yaşın üzerindeki hastanın kendisinden; 15-18 yaş arasındaki hastanın kendisinden ve ayrıca yasal temsilcisinden; bilinci kapalı, 15 yaşın altında, karar verme yetisi bulunmayan hastada ve tıbbi acil durumlarda yasal temsilciden onam alınır.